

ТАНИНЫ



PREMIUM® UVA SG

ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ НА ОСНОВЕ КАТЕХИНОВОГО ТАНИНА.
ХОРОШО РАСТВОРИМ И ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЭНОЛОГИЧЕСКОГО

СОСТАВ



Гранулированный продукт, полученный из танинов, извлеченных из винограда.

ХАРАКТЕРИСТИКИ



PREMIUM® UVA SG имеет ту же структуру, что и танины, естественно присутствующие в спелом винограде. Его состав из процианидина и катехина придает танину высокую реактивность по отношению к белкам, включая полифенольную оксидазу, и к красящим веществам. PREMIUM® UVA SG увеличивает срок хранения вина и повышает его устойчивость к окислению. Вина, обработанные этим продуктом, обладают более сложным букетом и большим объемом.

PREMIUM® UVA SG проходит специальную обработку под названием "инстантинизация", которая делает его быстро растворимым в воде с сохранением ценных органолептических свойств.

ПРИМЕНЕНИЕ



PREMIUM® UVA SG используется для обработки красных, розовых, белых вин и дистиллированных спиртных напитков. В винах он используется на начальных этапах и во время дображивания. Использование в сусле и молодых винах из винограда, зараженного ботритисом, предотвращает окислительные процессы, вызванные ферментами ботритиса. При винификации красных вин используется во время мацерации и черенкования, чтобы вытеснить антоцианиновые фракции, выделенные из кожицы.

PREMIUM® UVA SG используется для обработки белых и игристых вин для улучшения стабильности белков, поскольку уменьшает количество добавляемого бентонита, защищая целостность продукта также с точки зрения окислительно-восстановительных процессов.

Его антиоксидантное действие означает, что для стабилизации вина требуется меньше диоксида серы. Являясь хорошим окислительно-восстановительным регулятором, он может использоваться также для производства игристых вин.

При использовании PREMIUM® UVA SG соблюдайте соответствующие действующие законодательные нормы.

ТАНИНЫ



PREMIUM® UVA SG

ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ НА ОСНОВЕ КАТЕХИНОВОГО ТАНИНА.
ХОРОШО РАСТВОРИМ И ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЭНОЛОГИЧЕСКОГО



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

PREMIUM® UVA SG легко растворяется в воде. Тщательно растворите необходимое количество продукта в 10 частях воды, а затем добавьте в вино; не используйте металлические предметы или жесткую воду.
При использовании на последних этапах производства, непосредственно перед розливом, рекомендуем предварительно проверить стабильность белков вина.



ДОЗИРОВКА

От 5 до 15 г/гл при мацерации для красных вин;
От 3 до 8 г/гл для розовых вин;
От 1 до 5 г/гл для белых и игристых вин.



УПАКОВКА

Полиламинированные пакеты по 500г.



ХРАНЕНИЕ

Храните в сухом прохладном месте, защищенном от света. Тщательно закрывайте открытые упаковки.



БЕЗОПАСНОСТЬ

В соответствии с действующими европейскими нормами классифицируется как неопасный.