



EXTRARED L

ФЕРМЕНТНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КРАСНОГО ВИНА С ЭКСТРАГИРУЮЩЕЙ И СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТЬЮ

СОСТАВ



EXTRARED L - это пектолитический ферментный комплекс, обладающий особой активностью.

ХАРАКТЕРИСТИКИ



EXTRARED L - это энзиматический комплекс, который позволяет разрушать стенки клеток кожи и извлекать красители из вакуолей. EXTRARED L также помогает и ускоряет экстракцию дубильных полифенольных веществ.

Его состав был специально изучен для улучшения экстракции полисахаридных соединений на последних этапах мацерации. Полисахаридные вещества важны не только своей способностью создавать стабильные соединения с антоцианами, но и повышать тело и структуру вина.

EXTRARED L не обладает антоциановой активностью, поэтому его также можно использовать в производстве красных вин, поскольку он обеспечивает стабилизацию цвета в течение длительного времени.

EXTRARED L эффективен при температуре 10-30 °C. В пределах этих значений его активность увеличивается при повышении температуры. EXTRARED L не ингибируется обычными концентрациями диоксида серы.

ПРИМЕНЕНИЕ



EXTRARED L добавляется на последних этапах мацерации в красные вина, где применяется фракционированное и локализованное использование ZIMARED® PLUS и ZIMAFRUIT® в соответствии с Combo Approach®.

EXTRARED L увеличивает количество экстрагированных антоцианов и особенно улучшает стабильность цвета, соединяя их с дубильными и полисахаридными веществами. Благодаря своей ферментативной активности EXTRARED L обеспечивает более высокий урожай самотечного продукта при прессовании, а также улучшает процессы кларификации и фильтрации.

При использовании EXTRARED L соблюдайте соответствующие действующие законодательные нормы.



EXTRARED L

ФЕРМЕНТНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КРАСНОГО ВИНА С ЭКСТРАГИРУЮЩЕЙ И СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТЬЮ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Растворите жидкий фермент в небольшом количестве сусла/вина, затем добавьте раствор на пробку только на последних этапах мацерации, в соответствии с процедурой винификации красных вин Enologica Vason.



ДОЗИРОВКА

В мацерациях, где планируется фракционное использование ZIMARED PLUS®, количество EXTRARED L составляет 1-2 г/гл сусла и добавляется из верхней части крышки перед последним перекачиванием.



УПАКОВКА

Бутылки по 1 кг.



ХРАНЕНИЕ

Храните продукт в прохладном месте (10-15 °C). После использования плотно закройте упаковку.



ВНИМАНИЕ!

В соответствии с действующими европейскими нормами продукт классифицируется как опасный (см. Паспорт Безопасности Химической Продукции).